



# ЖЕЛЧЕГО́ННЫЕ СРЕ́ДСТВА

Авторы: Е. О. Борисова

ЖЕЛЧЕГО́ННЫЕ СРЕ́ДСТВА, лекарственные препараты, усиливающие образование жёлчи и жёлчных кислот в печёночных клетках (т. н. холеретики), а также способствующие выделению жёлчи из жёлчного пузыря в кишечник (холекинетики). Холеретич. свойствами обладают препараты жёлчи и жёлчных кислот (холензим, аллохол и др.), синтетические Ж. с. (цикловалон, гидроксиметилникотинамид, осалмид), мн. растит. препараты (почки берёзы, цветки василька синего, трава душицы, цветки бессмертника песчаного, кукурузные рыльца, масла – айрное, терпентинное, мяты перечной; водный экстракт плодов шиповника и др.). Холекинетич. Ж. с. вызывают специфич. раздражение слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки при приёме их внутрь (сульфат магния, сорбитол и др.), что приводит к выделению в кровь холецистокинина, который вызывает сокращение жёлчного пузыря и расслабление сфинктера общего жёлчного протока. Выделению жёлчи способствуют также [спазмолитические средства](#) и [холинолитические средства](#), нитраты. Бóльшая часть Ж. с. оказывает комбиниров. действие, а также обладает противовоспалит. и дезинфицирующим эффектами.

Ж. с. применяют при хронич. холециститах и холангитах, сопровождающихся гипокинетич. дискинезией жёлчных путей, для усиления желчеотделения перед дуоденальным зондированием. Применение Ж. с. может сопровождаться обострением воспалит. заболеваний кишечника, метеоризмом, диареей. Противопоказанием являются острые воспалит. и дистрофич. поражения печени, острый панкреатит, закупорка жёлчных протоков, кишечная непроходимость.

## Литература

Лит.: Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. М., 2003.