



НОТОЭДРОЗ

Авторы: Ф. И. Василевич, В. В. Горохов

НОТОЭДРОЗ, хроническое инвазионное заболевание разл. видов млекопитающих, вызываемое клещами из рода *Notoedres*, сопровождающееся кожным зудом и дерматитами. Болеют кошки, собаки, кролики, мышевидные грызуны. Клещи размером 0,2–0,45 мм округлой формы, обитают и размножаются в толще эпидермиса. Яйца клещей устойчивы к воздействию внешних факторов. Локализация Н. и поражения кожи – по краям ушных раковин, вокруг глаз, на лбу, носу, позднее – на спине и лопатках с образованием везикул, папул, корок. На поражённых местах шерсть выпадает, образуются складки кожи. У кошек в местах поражения отмечается зуд, у собак зуд отсутствует или выражен слабо. Источник возбудителя инвазии – больное животное, заражение контактное. Н. регистрируется поздно осенью и весной. Болеют животные разных возрастов и пород. Молодые животные более восприимчивы и болеют тяжелее. Диагноз – по клинич. признакам и на основании микроскопич. исследований соскобов кожи. Профилактика и меры борьбы: акарицидные препараты (напр., ивомек однократно, подкожно); деакаризация и дезинвазия помещений и инвентаря, а также поступающих в хозяйство животных совр. средствами.