



# ПАРАМФИСТОМАТОЗ

Авторы: Ф. И. Василевич, В. В. Горохов

---

**ПАРАМФИСТОМАТОЗ**, гельминтозное заболевание домашних и диких жвачных животных, вызываемое паразитированием трематод из подотряда *Paramphistomatata* в тонком кишечнике, сычуге (молодые формы) и в преджелудках – рубце, сетке и книжке (половозрелые формы). Развиваются с участием промежуточных хозяев – пресноводных моллюсков сем. катушек. Инвазирование круглогодично на пойменных и заливных пастбищах. П. протекает остро (угнетение, профузный понос, отёки) и хронически (исхудание, снижение продуктивности). Вспышки острого П. происходят через 1–1,5 мес после выгона скота на пастбище (в период развития и миграции молодых трематод). Гельминты механически и своими метаболитами нарушают функции сычуга и двенадцатиперстной кишки, вызывая обширные кровоизлияния, изменения в тканях. Диагноз: при жизни – по обнаружению яиц гельминтов в фекалиях и по клинич. признакам; посмертно – при обнаружении паразитов в соскобах слизистой оболочки сычуга и двенадцатиперстной кишки. Лечение антигельминтиками. Профилактика: выпас животных на культурных суходольных пастбищах или перевод на стойловое содержание; поение скота проводят из водоёмов с проточной водой. Профилактич. дегельминтизацию животных проводят в начале стойлового периода. П. регистрируется во многих странах Азии, Африки, Европы и Австралии.