



# ПАРАТИ́Ф

Авторы: С. Н. Жаров

---

ПАРАТИ́Ф (*пара...* и *тиф*), острое инфекционное заболевание, вызываемое особыми видами сальмонелл, сходных с возбудителем брюшного тифа. Возбудитель – *Salmonella paratyphi* А и В вырабатывает эндотоксин, патогенный только для человека. Заражение происходит при употреблении инфицированных воды, пищевых продуктов, при контакте с больными и носителями возбудителя через загрязнённые руки и бытовые предметы. Инкубац. период от 1 до 21 дня. Различают паратиф А и В.

Паратиф А чаще развивается остро, отмечаются катаральные явления (насморк, кашель и др.), гиперемия лица, инъекция сосудов склер. Сыпь появляется на 6–7-й день, обильная; может быть папулёзной, кореподобной. Часто наблюдаются рецидивы.

Паратиф В также характеризуется острым началом, явлениями *застроэнтерита*. Сыпь, как правило, появляется раньше, обильная, полиморфная, локализуется на туловище и конечностях. Рецидивы редки.

Исходом заболевания может быть выздоровление и освобождение организма от возбудителя, а также бактерионосительство (острое – до 6 мес и хронич. – св. 6 мес) (см. *Носительство возбудителей заразных болезней*). Диагностику, лечение и профилактику П. см. в ст. *Брюшной тиф*.