

ПЕНОЧКИ

Авторы: В. Лоскот



Фото Andreas Trepte / www.photonatur.de

Пеночка-весничка.

ПЕНОЧКИ (*Phylloscopus*), род мелких древесно-кустарниковых птиц сем. славковых. Длина 9–12,5 см, масса 4–14 г (пролётные до 17 г). Клюв короче головы, узкий, острый; крылья острые или закруглённые; хвост средней длины или короткий, прямо срезанный или выемчатый; ноги слабые, цевки тонкие, пальцы относительно длинные с цепкими когтями. В окраске оперения преобладают жёлтые, зелёные, охристые и бурые тона, низ нередко белый. У мн. видов через глаз проходит тёмная полоса, а над ним – светлая; у некоторых

имеются 1–2 светлые поперечные полосы на крыльях. Половой диморфизм отсутствует; молодые особи отличаются более рыхлым оперением. Полёт трепещущий, обычно непродолжительный. Держатся в кронах деревьев, кустарниках и среди крупнотравья; в поисках добычи неутомимо обследуют листву и тонкие ветви, ловят её также на лету или на земле.

Ок. 56–58 видов; населяют гл. обр. леса Евразии (от лесотундры до Больших Зондских о-вов), Новой Гвинеи и Соломоновых о-вов, а также Сев.-Западной (2 вида) и Тропич. (6 видов) Африки; лишь пеночка-таловка (*Ph. borealis*) проникла в Сев. Америку из Чукотки в зап. часть Аляски. Наибольшего видового разнообразия П. достигают в Гималаях (где селятся до выс. 5000 м), Тибете и горах Зап. Китая; перелётные виды зимуют на юге Европы, Азии и в Африке. В России гнездятся ок. 16 видов; в Европ. части наиболее обычны 3 внешне сходных, но резко отличающихся голосами вида: пеночка-весничка (*Ph. trochilus*), пеночка-теньковка (*Ph. collybita*) и

пеночка-трещотка (*Ph. sibilatrix*); широко распространены пеночка-таловка, зелёная пеночка (*Ph. trochiloides*) и пеночка-зарничка (*Ph. inornatus*). Питаются членистоногими (в осн. насекомыми, их личинками и яйцами, пауками), реже мелкими моллюсками, фруктами, ягодами и нектаром. Моногамы, известны случаи полигинии. Массивное, шаровидное гнездо с боковым входом укрывают на земле, в нишах среди травы или опавшей листвы, среди камней и в расщелинах скал, а также над землёй, в густых кустах (можжевельников, рододендронов) или на нижних ветвях темнохвойных деревьев. В кладке обычно 4–6 (до 9) яиц; насиживает самка 11–15 дней. Выводок кормят оба родителя; молодые особи покидают гнездо через 11–16 дней после вылупления. У части видов 2 выводка за сезон. В Красную книгу МСОП внесены 3 уязвимых вида с узкими ареалами.

В соответствии с молекулярно-генетич. данными предлагается выделять два рода П.: настоящие П. (*Phylloscopus*, до 26 видов) и расписные П. (*Seicercus*, 51 вид), которые объединяются в сем. пеночковые (*Phylloscopidae*).