



ПЕРЕНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Авторы: Е. А. Чернуха

ПЕРЕНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, удлинение беременности на 10–14 дней и более после предполагаемого срока родов. Различают истинное (биологическое) и ложное П. б. Причины истинного перенашивания: возраст матери, число предшествующих беременностей (в т. ч. абортов), воспалит. и гинекологич. заболевания, позднее наступление менархе, аномалии и пороки развития плода и др. При истинном перенашивании срок беременности обычно превышает 290–294 дня, отмечаются уменьшение окружности живота на 5–10 см, высокое стояние дна матки, нарушение состояния плода (усиление или ослабление движений, изменение частоты и тембра сердечных тонов). Плод достигает более высокой степени развития и рождается с признаками перезрелости: дети более крупные, кости черепа плотные, количество сыровидной смазки резко уменьшено или она отсутствует, дряблость, мацерация (размягчение и разрыхление), десквамация (слущивание клеток) кожи и др.; плодные оболочки зелёного цвета; масса и размер плаценты увеличены, в ней часто обнаруживают обызвествления и жировое перерождение. Всё это приводит к нарушению обмена веществ плода, его гипоксии, а иногда и к внутриутробной гибели. Профилактика истинного П. б.: предупреждение и своеврем. устранение у беременных нарушений функций нервной и эндокринной систем; тщательное наблюдение в женской консультации за беременными, склонными к П. б., своевременная их госпитализация.

Ложное П. б., или пролонгирование, характеризуется только удлинением её срока на 10–14 дней, признаков перезрелости у новорождённого и изменений в плаценте нет.

Литература

Лит.: Чернуха Е. А. Перенашивание беременности. М., 1982.