

ЗМЕЕШЕЙКОВЫЕ

Авторы: В. М. Лоскот



Американская змеешейка.

Фото В. М. Лоскота

ЗМЕЕШЕЙКОВЫЕ (Anhingidae), семейство птиц отр. пеликанообразных. Длина 0,8–1,0 м, масса 1,1–2,6 кг. Внешне похожи на бакланов, от которых отличаются длинным острым клювом, маленькой головой, тонкой змеевидной (отсюда назв.) шеей из 20 позвонков, более длинным и широким хвостом. Широкие крылья позволяют парить в воздухе. Окраска в осн. тёмная, с

зелёным металлич. отливом и серебристым рисунком на крыльях; у самок и молодых низ более светлый. 1 род, 2 вида (по др. системе, 5). Американская змеешейка, или анхинга (*Anhinga anhinga*), населяет тропики и субтропики Нового Света. 4 подвида чернобрюхой змеешейки (*A. melanogaster*) распространены в Старом Свете: *A. m. rufa* – в Африке и Юго-Зап. Азии, *A. m. melanogaster* – от Индии до Филиппин, *A. m. novaehollandiae* – в Новой Гвинее и Австралии, *A. m. vulsini* – на о. Мадагаскар. З. селятся отд. парами или небольшими группами по берегам пресных или солоноватых, стоячих или слабопроточных внутренних водоёмов. Прекрасно плавают и ныряют. Питаются рыбой, земноводными и водными беспозвоночными. При ловле добычи птица может резко выпрямлять шею и мгновенно выбрасывать голову вперёд. Массивное гнездо З. строят из веток на заламах тростника, кустах и невысоких деревьях. Кладку из 4 (2–6) яиц насиживают оба родителя ок. 28 сут. Птенцы вылупляются голыми, затем покрываются густым белым пухом; оперившиеся молодые покидают гнездо в возрасте 6–8 нед.