



# ЛАТАСТИИ

Авторы: В. Ф. Орлова

---

ЛАТАСТИИ (*Latastia*), род ящериц сем. настоящих ящериц (*Lacertidae*). Тело стройное, слегка уплощённое (длина до 40 см и более), шейная складка хорошо выражена, хвост очень длинный, цилиндрический. Нижнее веко чешуйчатое, непрозрачное. Спинная чешуя мелкая, однородная, гладкая или в разной степени килеватая. Брюшные щитки крупные, с усечённым или прямым задним краем, расположены в 6 (реже в 8) продольных рядов. Пальцы слегка сжаты с боков, на нижней стороне – два ряда чешуй с заострёнными киями. Имеются бедренные поры; выделение из них секрета активизируется в период размножения. 6–11 видов. Обитают в зоне полупустынь и опустыненных саванн Африки: распространены в низинных областях – от Сенегала на западе до Африканского Рога на востоке, на юге – до Малави и Замбии. Активны днём. Экология и размножение мало изучены. Самый крупный вид – латастия длиннохвостая (*L. longicaudata*); 3 подвида. Длина более 40 см; хвост составляет ок.  $\frac{3}{4}$  общей длины тела. Голова узкая, заострённая на конце. Окраска изменчива: от бледно-серой до коричневой, красновато-коричневой или кирпично-красной. Осн. тип рисунка спины – тонкие бежевые продольные полосы с расположенными между ними более тёмными пятнами. Иногда эти пятна сливаются, образуя сетчатый или поперечно-полосатый рисунок. На боку – широкая кирпично-красная полоса, окаймлённая снизу более тонкой светлой полоской. Самцы отличаются от самок более крупными размерами, утолщённым основанием хвоста, более яркой окраской. Распространена от Сенегала и Мали до Египта, включая Синайский п-ов, на юге Эфиопии и Судана, в Кении и на северо-востоке Танзании. Населяет открытые ландшафты: полупустыни, кустарниковые саванны, акациевые редколесья. Активна днём, питается насекомыми и др. беспозвоночными. Бегаёт с большой скоростью. В качестве убежищ использует норы грызунов, полости под камнями и поваленными деревьями. Другой распространённый вид – *L. johnstoni* – обитает в центр. части

Танзании и в прилегающих районах Демократич. Республики Конго, Замбии, Мозамбика и на севере Зимбабве. Длина тела ок. 21 см. Отличается сильно килеватой чешуёй. Самцы в период размножения приобретают красно-коричневую окраску с беловатыми или бледно-голубыми пятнышками по бокам и ярко-жёлтыми глазками в передней части боков. У самок – яркая, окаймлённая чёрным, жёлтая полоса на спине, две тонкие жёлтые линии с каждой стороны, серия жёлтых пятен с чёрной окантовкой между двумя боковыми линиями. Активна днём.