

ГОЛУБИНЫЙ ГОРОХ

Авторы: С. С. Михалёв



Голубиный горох.

ГОЛУБИНЫЙ ГОРОХ, каянус (*Cajanus cajan*), растение семейства бобовых. Зерновая, кормовая и овощная культура. В диком виде неизвестен. Стебель (высотой 0,5–4 м) ветвистый, одревесневающий. Корневая система мощная, размер клубеньков 0,2–2 см. Листья тройчатые; цветки (длина до 3 см) красновато-жёлтые, расположены в пазушных или верхушечных кистях. Плод – боб (длина до 8 см) с семенами различной окраски. Г. г. не

требователен к плодородию почвы, засухо- и жароустойчив; самоопылитель.

Большинство сортов многолетние, но культивируют Г. г. и как однолетнее растение. Вегетационный период 100–260 суток. Под Г. г., по данным ФАО (2014), в мире занято около 6,77 млн. га, в странах Азии и Африки (ок. 75% – в Индии). Валовой сбор зерна составил свыше 4,86 млн. т. Основные производители зерна в 2014 в мире: Индия (около 3,3 млн. т), Мьянма (575 тыс. т); производство зерна странами Африки составляет около 850 тыс. т. Зерно и зелёные бобы используют в кулинарии, зелёную массу – на корм скоту, одревесневшие стебли – как топливо; выращивают в качестве живой изгороди. Урожайность зерна колеблется от 0,6 до 1,1 т/га. Вредители – зерновки.