

ПОДАЛИРИЙ

Авторы: А. В. Свиридов



Подалирий.

Фото Tim Bekaert

ПОДАЛИРИЙ (*Iphiclides podalirius*), бабочка сем. парусников. Крылья 50–72 мм в размахе, осн. фон их бледно-жёлтый, передняя пара с чёрным рисунком из клиновидных полос, задняя – с чёрно-голубым окаймлением и длинными (до 15 мм) хвостиками. Распространён в Евразии (на севере ареала до Балтийского м., на востоке – до Зап. Китая), на западе Сев. Африки; в РФ – в ср. полосе и южнее, на востоке – до Алтая.

В горах встречается на выс. до 2400 м. При благоприятных климатич. условиях в ср. полосе нередко образует популяции с высокой численностью, способные просуществовать не один год. Лёт в середине апреля – июне. В юж. районах РФ даёт до 2–3 поколений. 1-е поколение отличается от последующего рисунком на крыльях (сезонный диморфизм). Откладывает по 1–2 яйца на нижней стороне листьев. Внешность гусеницы в старшем возрасте (после ряда линек) имитирует лист тёрна. Гусеницы питаются листьями плодовых деревьев и кустарников сем. розовых (вред плодовым культурам обычно невелик). Зимуют куколки.