



ПОЛЁВКИ

Авторы: Н. А. Щипанов

ПОЛЁВКИ (Arvicolinae), подсемейство грызунов сем. хомяковых; в некоторых системах выделяют в самостоят. семейство. Размеры мелкие или средние, длина тела большинства видов ок. 10–15 см, у ондатры до 36 см. Все представители П. имеют характерный облик: плотное вальковатое тело, относительно невысокие конечности и маленькие уши, короткий (у большинства видов менее половины длины тела) или очень короткий (1–2 см) хвост. Коренные зубы и резцы растут постоянно. Св. 40 родов; в России представлены роды: *КОПЫТНЫЕ ЛЕММИНГИ*, лесные лемминги (*Myopus*), настоящие лемминги (*Lemmus*), *лесные полёвки*, каменные П. (*Alticola*), водяные П. (*Arvicola*), ондатры (*Ondatra*), *серые полёвки*, обыкновенные, или степные, пеструшки (*Lagurus*), *слепушонки*. Распространены в Сев. полушарии: по всей Евразии до Сев. Африки и в Сев. Америке, включая сев. часть Мексики. Активны круглогодично. Питаются разл. частями растений. Есть виды, адаптированные к подземному, наземному и полуводному образу жизни. Многие виды достигают высокой, в отд. годы экстремально высокой, численности. Большинство видов являются осн. вредителями полевых культур, иногда садов и пастбищ. Ондатра имеет большое значение как объект пушного промысла. Практически все виды П. имеют ключевое значение как в формировании биогеоценозов (в частности, в создании плодородия почвы), так и как объекты питания мн. ценных пушных видов хищных: песца, соболя, куницы и др. П. служат распространителями мн. опасных природно-очаговых заболеваний человека – лептоспироза, туляремии и др. Ряд узкоареальных видов включён в Красный список МСОП как виды, находящиеся в угрожаемом состоянии.