



# ПОЛИНЕВРОПАТІИ

Авторы: Н. Н. Яхно

ПОЛИНЕВРОПАТІИ (от *поли...* и *невропатии*), группа заболеваний периферич. нервной системы, характеризующихся одновременным поражением нескольких нервов, чаще всего конечностей; разновидность невропатии. В связи с тем что при П. в большей степени повреждаются периферич. отрезки нервов конечностей, осн. клинич. симптомами П. являются мышечная слабость и атрофии мышц стоп, голеней, кистей, предплечий. Кроме того, в этих отделах конечностей возникают нарушения тактильной и суставно-мышечной чувствительности, сопровождающиеся ощущениями онемения, «ползания мурашек», болями, затруднением передвижения в темноте и др. субъективными проявлениями. Поражение вегетативных (автономных) волокон может проявляться изменением процесса потоотделения, температуры тела, окраски и целостности кожи, нарушением кровообращения в ней, расстройством нервной регуляции деятельности внутр. органов (сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, дыхательной, мочеполовой систем). Для уточнения диагноза П. используют, в частности, методы электронейромиографии и вызванных сенсорных биопотенциалов головного мозга, иногда – морфологич. исследование биоптатов кожных нервов. Лечение П. основано как на общих принципах лечения невропатий, так и на учёте причины и клинич. особенностей конкретного вида П. Для реабилитации больных применяют методы физиотерапии, лечебной физкультуры, электронейростимуляцию. Эффективность лечения и прогноз зависят от причины, степени выраженности поражений и варьируют от полного выздоровления до остаточных тяжёлых двигат., чувствит. и вегетативных расстройств. Широко применявшийся ранее термин «полиневрит» для обозначения множественных поражений периферич. нервов гл. обр. инфекционно-токсич. происхождения в совр. науч. лит-ре не используется, т. к. при этих формах патологии в поражённых нервах, как правило, отсутствует истинное воспаление и преобладают дистрофич. изменения.