

# ПОЛОСАТЫЙ ТЮЛЕНЬ

Авторы: К. А. Жариков



Фото Peters Jomilo

Полосатый тюлень.

ПОЛОСАТЫЙ ТЮЛЕНЬ, крылатка (*Phoca fasciata*), млекопитающее сем. настоящих тюленей. Длина тела 1,5–1,9 м, масса 90–150 кг. Голова небольшая, тело более стройное, чем у др. видов семейства. Белый, длинный и мягкий шёрстный покров новорождённых после линьки сменяется пепельно-серым. У взрослых зверей общий окрас переходит к чёрно-бурому, при этом проявляются широкие желтовато-белые полосы.

Одна опоясывает шею, другая – туловище в

районе крестца; также на каждом боку светлая полоса идёт вокруг переднего лапа от плеча до середины тела (образующиеся внутри этих полос тёмные пятна несколько напоминают сложенные крылья птицы, отсюда второе назв.). Самки окрашены светлее и менее контрастно. Передние лапы вооружены длинными и тонкими крючковатыми когтями. П. т. распространён в Охотском и Беринговом морях, заходя на юг морей Чукотского и Бофорта и север Японского моря. В сезон размножения (апрель – май) П. т. выходят на дрейфующие вдали от берегов ледовые массивы, образуя разреженные скопления; в остальное время звери поодиночке держатся в пелагич. части моря. П. т. питается головоногими моллюсками, ракообразными и рыбой, вероятно, способен к погружениям на глубины до 200 м. В связи с пелагич. образом жизни промысловое значение невелико, активно добывался только с судов во 2-й пол. 20 в.