

ПОМОРНИКОВЫЕ

Авторы: Е. А. Коблик



Средний поморник (*Stercorarius pomarinus*).

Фото Peters Jomilo

ПОМОРНИКОВЫЕ (*Stercorariidae*), семейство птиц отр. ржанкообразных. П. – эволюционно молодая группа, известны с позднего миоцена (ок. 12 тыс. лет назад). Выделяют 1–2 совр. рода (*Stercorarius*, *Catharacta*), 7 видов (в России 4 вида). Длина тела 45–55 см, масса 0,4–2,1 кг, размах крыльев 100–150 см; самцы чуть крупнее самок. Похожи на чаек, но клюв с отчётливым острым крючком на вершине. Общая окраска преим. тёмная (иногда с беловатым низом). Ноги, радужина глаз, клюв тёмные или сероватые. Хвост клиновидный, часто с выступающими за его обрез центр. рулевыми перьями. Пальцы снабжены загнутыми острыми

когтями, перепонки развиты хорошо. Полёт быстрый и манёвренный, могут пикировать, зависать, парить. Молодые особи отличаются от взрослых укороченными средними рулевыми перьями и поперечной рябью на теле и крыльях; окончат. взрослый наряд появляется на 4–6-й год жизни. П. издают визгливые, гнусавые, мяукающие и лающие крики. Размножаются в высоких широтах Сев. и Юж. полушарий, на миграциях и зимовках встречаются в акваториях всех океанов и многих внутр. морей. Питаются рыбой, поедают птичьи яйца, птенцов, грызунов и насекомых, изредка – падаль, а также тундровые ягоды. Способны глотать целиком очень крупные объекты, вплоть до сусликов и небольших чаек, благодаря эффективному механизму «распяливания» челюстей. Для них характерен клептопаразитизм – нападение в воздухе на др. птиц с целью отнять пищу. Гнездятся по скалистым мор.

берегам и островам, в тундрах, на галечниковых косах. Обычно селятся отд. парами, реже – группами, при этом часто тяготеют к колониям др. мор. птиц. У гнезда чрезвычайно агрессивны, пикируют на любое крупное животное или человека. Гнездо – ямка со скудной выстилкой на сухом месте. В кладке 2 яйца с тёмными пятнами по оливково-коричневому фону. Насиживают оба партнёра, 25–32 дня; пуховые птенцы однотонно-бурые, до полного оперения держатся недалеко от гнезда. Выкармливание продолжается и спустя некоторое время после подъёма молодых особей на крыло, который происходит в возрасте 3–4 нед, а у крупных видов (группа Catharacta) – в возрасте 5–6 нед. Половозрелость наступает в 3–4 года у мелких видов и в 5–8 лет у крупных.