

# ПРИКАСПИЙСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ



Солончаки на Прикаспийской низменности.

Фото М. Л. Зайцева

ПРИКАСПИЙСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ, в России (Дагестан, Калмыкия, Волгоградская и Астраханская области, Ставропольский край) и Казахстане (Атырауская и Западно-Казахстанская области). Расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, на сев. побережье [Каспийского моря](#). На севере ограничена склонами Общего Сырта, на западе – возвышенностями Ставропольской,

Ергени и Приволжской, на востоке – Предуральским плато и плато Устюрт. Пл. ок. 200 тыс. км<sup>2</sup>. Плоская ровная поверхность, полого наклонённая к Каспийскому м., уровень которого ниже уровня Мирового ок. на 27 м, к окраинам поднимается до 100 м. Рельеф осложнён небольшими соляными куполами (выс. до 150 м, гора [Богдо Большое](#)); в юж. части – золотой рельеф: массивы подвижных песков и [бэровские бугры](#) – в обширной дельте Волги, в устье рек Кума и Эмба. Геоструктурно соответствует [Прикаспийской синеклизе](#). Известны месторождения нефти и газа ([Прикаспийская нефтегазоносная провинция](#)), каменной и калийной солей ([Прикаспийский калиеносный бассейн](#)). В зап. части П. н. пересекается Волго-Ахтубинской поймой. Наиболее крупные реки: Волга, Урал, Терек, Сулак, Кума. Солёные озёра (Эльтон, Баскунчак и др.). Климат сухой континентальный с относительно суровой малоснежной зимой (ср. темп-ра января от –14 °С на севере до –8 °С на юге) и жарким (ср. темп-ра июля ок. 23 °С) засушливым летом. Осадков выпадает ок. 200 мм в год. Во внутр. приморской части типичны пустынные, на севере, западе и юго-западе – полупустынные ландшафты. Астраханский и Богдинско-Баскунчакский заповедники.