

ПУСТЕЛЬГИ

Авторы: В. М. Лоскот



Обыкновенная пустельга.

ПУСТЕЛЬГИ, сборное название птиц среднего размера отр. соколообразных. В группу включают 13–15 из 40 видов рода настоящих соколов (*Falco*), сходных по внешнему виду и образу жизни. Длина от 15–23 см при ср. массе самцов 73 г, самок – 87 г (сейшельская пустельга, *F. agaeae*) до 33–36 см при массе 181–334 г (большая пустельга, *F. rupicoloides*).

В окраске оперения преобладают красноватые, охристые и серые, реже бурые тона, для

большинства характерен пятнистый рисунок из тёмных продольных штрихов и поперечных полос и пятен. Крылья острые, чёрные или тёмно-бурые; хвост относительно длинный, прямой или закруглённый, обычно с широкой тёмной предвершинной и узкой белой или охристой вершинной полосой. Восковица и лапы жёлтые. У 5 видов выражен половой диморфизм окраски оперения (молодые похожи на самку); у некоторых имеются светлые, рыжие и тёмные морфы. Населяют гл. обр. тропич. и умеренные области всех материков и ряд островов Индийского и Тихого океанов. Предпочитают открытые ландшафты от лесотундры до полупустынь и скалистые мор. побережья; избегают влажных тропич. лесов и жарких пустынь; в горах обитают до выс. 4500 м. Обыкновенная П. (*F. tinnunculus*) широко распространена в Евразии (во всех зонах, кроме тундры, в т. ч. в России) и Африке. Степная П. (*F. naumanni*) гнездится гл. обр. в степях и полупустынях Евразии и Сев.-Зап. Африки (в России от сухих предгорий Сев. Кавказа и юга Европ. части до степей Алтая и Саян); зимует в Африке (южнее Сахары) и Аравии. В Африке гнездятся ещё 5 видов П.; Новый Свет населяет воробынная П. (*F. sparverius*), Австралию – седобородая П. (*F.*

senchroides); на океанич. островах обитают 4 вида. Питаются П. насекомыми (преим. крупными прямокрылыми, жуками, стрекозами, термитами), мелкими грызунами (полёвками, мышами, молодыми сусликами) и пресмыкающимися, реже ловят небольших птиц. Добычу высматривают с присады или в трепещущем полёте, зависая на одном месте, также ловят её в воздухе лапами; кормовые участки могут располагаться на удалении до 7 км от гнёзд. Селятся отд. парами или колониями до нескольких десятков пар; гнездятся в расщелинах и нишах скал, береговых обрывов или оврагов, также в дуплах, гнёздах др. птиц (часто врановых) и сооружениях человека (могильных насыпях из камней, под крышами и на зданиях, в т. ч. совр. городов и посёлков). В кладке 1–7 (обычно 4–5) яиц; насиживают оба партнёра 26–31 (большая П. 32–35) день; молодые особи покидают гнёзда в возрасте 27–36 дней, взрослые опекают их ещё 2–4 нед. Численность степной П. в России резко сократилась, вид внесён в Красную книгу РФ. В Красной книге МСОП 3 вида: вымершая П. с о. Реюньон (*F. duboisi*), сейшельская и маврикийская (*F. punctatus*) П., находящиеся под угрозой исчезновения.