



ПРЕДРАК

ПРЕДРАК (предопухоловое состояние), общее название врождённых или приобретённых диспластических (обусловленных нарушением развития органов или тканей) изменений, на основе которых возможно возникновение [опухоли](#). Понятие «П.» возникло в 1896 на лондонском Междунар. конгрессе дерматологов и применялось только по отношению к наиболее доступному для клинич. наблюдения раку кожи. В дальнейшем оно распространилось на аналогичные процессы в др. тканях и органах (П. нижней губы, молочных желёз, желудка и др.). Различные по своим проявлениям состояния П. представляют единый в своей основе патологич. процесс. П. может подвергаться регрессии (постепенному исчезновению его проявлений) или надолго остановиться в своём развитии. Принято выделять т. н. фоновые процессы в организме (напр., хронич. бронхит, рецидивирующая пневмония, мастопатия, длительно незаживающие язвы и свищи), которые реже служат причиной опухолей, и собственно П., к которым относят очаговые пролиферативные (см. [Пролиферация](#)) изменения, возникающие гл. обр. на основе фоновых процессов (так, из многочисл. форм гастрита как П. рассматривают только атрофич. гастрит с глубокой структурной перестройкой слизистой оболочки желудка). Многочисл. проявления собственно П. подразделяют на облигатные (обязательные) и факультативные (необязательные). Облигатные проявления включают генетически предопределённые процессы, при которых чаще всего развиваются злокачеств. опухоли: [ксеродерму пигментную](#); [меланоз](#) Дюбрея; эритроплазию Кейра; врождённый диффузный полипоз (см. [Полипы](#)) толстой кишки. Факультативные состояния более многочисленны, обычно не бывают врождёнными и наследственными, не обязательно переходят в злокачеств. опухоли. К ним относят: доброкачеств. опухоль кератоакантому нижней губы; разл. виды дискератозов (ороговения части клеток эпидермиса); [лейкоплакию](#); поверхностные незаживающие язвы полости рта вследствие травм кариозными зубами и зубными протезами;

папилломы полости рта, носа и носоглотки; лейкоплакии и фибромы гортани; аденому или узловой зоб щитовидной железы; хронич. гастрит, язвенную болезнь и полипы желудка; язвенный колит; [эрозию шейки матки](#) и др. В профилактике злокачеств. опухолей важную роль играет своеврем. выявление и лечение П., а также устранение факторов, влияющих на развитие как П., так и злокачеств. опухолей.

Литература

Лит.: Шабад Л. М. Предрак в экспериментально-морфологическом аспекте. М., 1967; Клиническая онкология / Под ред. Н. Н. Блохина, Б. Е. Петерсона. 2-е изд. М., 1979. Т. 1; Ранняя онкологическая патология / Под ред. Б. Е. Петерсона, В. И. Чиссова. М., 1985.