

ПУТОРАКИ

Авторы: Н. А. Щипанов



Фото Н. Усика
Пегий пutorак.

ПУТОРАКИ (*Diplomesodon*), род млекопитающих сем. землеройковых отр. землеройкообразных (*Soricomorpha*); единственный вид – пегий П. (*D. pulchellum*). Внешне похож на др. землероек, но отличается необычной окраской: верхняя половина тела пепельно-серая или даже коричневатая, нижняя – чисто-белая.

Посередине спины – большое овальное белое пятно. У некоторых особей пятно может быть сокращено до узкой белой полосы. Известны альбиносы. Длина тела 5,4–7,6 см, хвоста 2–3 см. Масса тела 7–13 г. Морда вытянута мало, хоботок короткий. Уши почти не выступают над

мехом. По краям ступней и кистей оторочка жёстких волос. Хвост равномерно покрыт короткими жёсткими волосками. Пегий П. – эндемик пустынь Ср. Азии и Казахстана. Распространён от Волжско-Уральского междуречья до границ Афганистана и Прибалхашья. Предпочитает песчаные пустыни, встречается и на лёссовых почвах. В России – в песчаных пустынных и полупустынных областях Сев.-Вост. Прикаспия. Активен преим. в тёмное время суток. Может быстро зарываться в песок. Длина собств. норы П. может достигать 3 м; она заканчивается гнездовой камерой диаметром ок. 20 см. Питается разл. беспозвоночными и мелкими ящерицами, которых поедает вместе с костями. За сутки потребляет корм в количестве, в полтора раза превышающем собств. массу. Беременность ок. 30 дней. В год до 3 выводков по 4–5 детёнышей. Обычно редки или немногочисленны. Участвуют в эпизоотии чумы. Численность вида стабильна и, согласно Красному списку МСОП, опасений не

вызывает.