



# РАНА

Авторы: С. С. Харнас

---

РАНА, механич. повреждение тканей организма (ранение) в виде нарушения целостности кожи или слизистых оболочек. Осн. местные признаки Р. – зияние краёв повреждённой ткани, боль и кровотечение. Р. классифицируют: по причинам повреждения (случайные, боевые, операционные); характеру повреждения (колотые, резаные, ушибленные, рубленые, огнестрельные, укушенные, размозжённые и др.); наличию инфекции (асептические и инфицированные); прониканию в полости тела (проникающие и непроникающие). В зависимости от этих факторов течение и последствия Р. различаются в значит. степени. Напр., проникающие Р. опасны возможным инфицированием внутр. органов. Для ушибленных и рубленых Р. характерно обилие нежизнеспособных («размятых») тканей и сгустков крови, способствующих развитию анаэробной инфекции. В течении раневого процесса выделяют фазы воспаления (1–5-й дни), регенерации (6–14-й дни) и заживления (с 15-го дня). Заживление Р. зависит от её характера и наличия или отсутствия инфекции. Т. н. первичным натяжением заживают резаные неинфицированные Р. путём наложения швов, скобок и др. Вторичное натяжение протекает более длительно, проходя стадию образования *грануляционной ткани*.

## Литература

Лит.: Диагностика и лечение ранений. М., 1984.