

# РОЗА

Авторы: А. И. Долганюк



Фото Г. Н. Романовой  
Роза плетистая.

РОЗА, шиповник (*Rosa*), род растений сем. розовых. В умеренных и субтропич. областях Сев. полушария, в горных районах тропиков произрастает 300–500 видов, в РФ – 65–70 видов. Р. – листопадный или вечнозелёный кустарник с длинными, иногда до 6 м, побегами с шипами. Листья сложные, непарноперистые, с приросшими к черешкам прилистниками. Цветки простые, полумахровые или махровые, одиночные или в щитковидных соцветиях разл. окраски (есть и многоцветные формы), обычно с ярко выраженным ароматом. Плоды – мелкие орешки, заключённые в разросшийся мясистый

или деревянистый гипантий. Сорты, используемые в садоводстве, относят к трём группам: видовые (дикорастущие), старинные парковые (известные до 1867 – дамасские, чайные и др.) и совр.; две последние группы подразделяют на 36 садовых групп. Группа совр. Р. – флорибунда, грандифлора, чайно-гибридные, миниатюрные, мини-флора (патио), полиантовые, шрабы, плетистые крупноцветковые и др., а также их гибриды. Выращивают Р. в декоративных целях (солитеры, бордюры, группы, розарии, вертикальное озеленение и др.), в противоэрозионных и защитных насаждениях, а также как источник сырья для пром-сти (сироп, розовое масло и др.). Осн. вредители Р. – розанная тля, обыкновенный паутинный клещ, розанный нисходящий пилильщик. Осн. болезни – мучнистая роса, ржавчина, цитоспороз, септориоз, серая гниль, а также бактериальный рак корней и стеблей. Размножают Р. вегетативно (окулировкой, черенками).

# Литература

Лит.: Воронцов В. В., Коробов В. И. Все о розах. 2-е изд. М., 2012.