

САДЖА

Авторы: Е. А. Коблик



Саджа.

Фото Sergey Yeliseev

САДЖА, копытка (*Syrhaptus paradoxus*), птица сем. рябковых (*Pteroclididae*). Длина (вместе с шиловидным хвостом) 40 см, размах крыльев до 71 см, масса 200–300 г. В отличие от др. рябков, задний палец отсутствует, остальные укорочены, срастаются до широких притуплённых когтей; имеют общую жёсткую подошву (отсюда второе назв.). Вся лапа, кроме подошвы, густо оперена. В полёте постоянно перекликаются мелодичными трелями. Осн. тон

окраски буроватый, с пестринами, тёмное пятно на брюхе. Область постоянного гнездования – от Прикаспия до Маньчжурии. Предпочитает глинистые и щебнистые полупустыни с полынью, солянками, караганой, сухие степи с изреженной растительностью, реже селится в ковыльно-типчаковых степях, бугристых закреплённых песках. Характерны периодические (примерно 20 раз за 100 лет) массовые инвазии далеко за пределы гнездового ареала: на Запад (до Великобритании и Франции) или на Восток (до Кореи, Японии, Тайваня). Близкий вид – тибетская С. (*S. tibetanus*), встречается на Памире и в Тибете.