

САЛАМАНДРЫ НАСТОЯЩИЕ

Авторы: Н. Н. Иорданский



Саламандры: 1 – кавказская (*Mertensiella caucasica*); 2 – пятнистая (*Salamandra atra*).

Рис. Е. Н. Федорченко

САЛАМАНДРЫ НАСТОЯЩИЕ, саламандровые (*Salamandridae*), семейство хвостатых земноводных. Известны со среднего эоцена. Филогенетически С. н. объединяются с [амбистомами](#), [амфиумами](#), [безлёгочными саламандрами](#) и [протейми](#) в группу *Salamandroidea*. Тело (до 30 см в длину) от жёлтой до чёрной окраски, иногда с полосами и пятнами. Позвонки задневогнутые. Зубы на верхней и нижней челюстях, нёбные – в 2 продольных ряда (иногда изогнутых S-образно). Развиты веки. У взрослых С. н. есть лёгкие. У ряда видов имеются околоушные железы (паротиды), в брачный период – продольные кожные гребни на спине и хвосте. На передних конечностях 4 пальца, на задних 4–5.

Распространены в Евразии, Сев. Африке и Сев. Америке. Ок. 20 родов, 100 видов (в России 4 вида из рода [тритоны](#)). Наземные (собственно саламандры) и водные (тритоны) животные; населяют сырые тенистые леса, берега рек и ручьёв. Активны в сумерках и ночью. Питаются мелкими беспозвоночными. Осеменение внутреннее. У большинства личинки развиваются в водоёмах. Встречаются яйцеживородящие и живородящие. У некоторых С. н. известна [неотения](#). Саламандрами именуют также ряд земноводных из др. семейств ([исполинские саламандры](#), [безлёгочные саламандры](#)).