

# СОБОЛЬ

Авторы: Н. А. Щипанов



Соболь.

СОБОЛЬ (*Martes zibellina*), млекопитающее рода куниц. Длина тела 32–58 см, хвоста 9–17 см, масса 0,9–1,8 кг. Самцы крупнее самок.

Туловище вытянутое, конечности короткие, пальцеходящие. Лапы широкие. мех густой, мягкий, пушистый. Окраска одноцветная, от светлой палево-жёлтой до почти чёрной. По размерам и окраске выделяют до 30 географич. рас: чем темнее окраска, тем ценнее мех.

Внешне похож на лесную куницу, отличается от

неё слабо выраженным пятном на груди или его отсутствием, более коротким хвостом (менее половины длины тела). В природных условиях скрещивается с лесной куницей (см. *Кидус*). Распространён в лесной зоне Сибири, край ареала заходит на север Вост. Европы. Населяет разл. типы леса, предпочитая массивы с наличием кедра или кедрового стланика. Ведёт наземный образ жизни, хорошо лазает по деревьям. Питается разл. мелкими млекопитающими и небольшими птицами, может нападать на зайцев; в рационе также ягоды, кедровые орехи. Гнёзда обычно устраивает в дуплах деревьев. Ведёт одиночный образ жизни на индивидуальных участках. Самка спаривается с несколькими самцами. Характерно наличие латентного периода, из-за чего продолжительность беременности составляет 245–298 дней. Обычно в помёте 2–3 детёныша. Они рождаются слепыми, с закрытыми слуховыми проходами, покрытые редким пухом, массой 25,3–31,2 г. Половой зрелости достигают на 2-й (в неволе на 3-й) год жизни. Ценный объект промысловой охоты и пушного звероводства. К 1930-м гг. из-за перепромысла С. практически исчез на б. ч. ареала. Меры по охране и реинтродукции позволили восстановить поголовье и уже в 1960-е гг. С. вновь стали

промышлять (ежегодно до нескольких десятков тыс. шкур). Ныне состояние С. опасений не вызывает.