



# СИРИНГОМИЕЛИЯ

СИРИНГОМИЕЛИЯ (от греч. σῦριγξ – свирель, трубка, μυελός – спинной мозг), хронич. заболевание спинного мозга, характеризующееся прогрессирующим течением и преобладанием расстройств чувствительности. Впервые его описал как самостоят. заболевание под назв. «С.» франц. врач Ш. П. Оливье д'Анже (1796–1845) в 1824. Этиология С. окончательно не установлена. Её связывают с неправильным эмбриональным развитием спинного мозга (возможно влияние наследственности) и воздействием внешних факторов (травмы, инфекции, интоксикации). В основе проявлений С. – образование в веществе спинного мозга полостей разл. размеров, конфигурации и локализации и разрастание *нейроглии*. С. наблюдается чаще у мужчин. Начинается обычно в молодом возрасте (до 30 лет). Возникают боль в шейно-плечевой области и руке, онемение в разл. частях тела, снижение болевой и температурной чувствительности (в связи с чем не исключены ожоги) при сохранности других её видов. Появляются атрофии мышц верхнего плечевого пояса, выпадение сухожильных рефлексов; искривления позвоночника, поражение суставов; парез мягкого нёба, расстройства речи и глотания, функций тазовых органов; нижний спастич. парепарез; вегетативно-трофич. нарушения и др. Часто выявляются аномалии развития (кифосколиоз, полимастия, асимметрия лица и др.). Возможны периоды стабилизации, длящиеся неск. лет. Лечение преим. консервативное (витамины, физиотерапия, лечебная физкультура и др.). По показаниям – хирургич. лечение. Прогноз для жизни благоприятный.

## Литература

Лит.: Борисова Н. А., Валикова И. В., Кунаева Г. А. Сирингомиелия. М., 1989; Неврология: Национальное руководство. М., 2013.