



СТАФИЛОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Авторы: Б. П. Богомолов

СТАФИЛОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ, группа инфекц. болезней, вызываемых разл. видами стафилококков, из которых наибольшую *патогенность* проявляет золотистый стафилококк. Заражение возможно при контакте с больными и носителями *S. i.*, через предметы обихода, воздушно-капельным и пищевым путями. Для *S. i.* характерно многообразие клинич. проявлений – от местных воспалит. процессов (т. н. очаговая инфекция) до *сепсиса*. Среди очаговых инфекций преобладают поражения кожи и слизистых оболочек, как поверхностные (*фолликулит*, *фурункул* и др.), так и глубокие (*эидраденит*, *флегмона*, *абсцесс*). Стафилококки могут поражать дыхательные и мочевые пути, желудочно-кишечный тракт (*пищевые токсикоинфекции* и др.), сердце (миокардит, эндокардит) и др. *S. i.* является причиной хронич. интоксикации и длительного умеренного повышения темп-ры тела – т. н. субфебрилитета. Др. виды стафилококка (эпидермальный и сапрофитный), являясь представителями нормальной *микробиоты* человека, могут стать патогенными при ослаблении его иммунитета. Лечение зависит от клинич. проявлений *S. i.* (антибиотики, специфич. иммунопрепараты, гемосорбция, плазмаферез; хирургич. лечение и дренирование очага воспаления при локализованных формах *S. i.* и др.).

Литература

Лит.: Стафилококки и стафилококковая инфекция. Саратов, 1980.