

# СТЕНБОКИ

Авторы: Н. А. Щипанов



Обыкновенный стенбок.

Фото Charles Peterson / flickr.com

СТЕНБОКИ (*Raphicerus*), род млекопитающих сем. полорогих. 3 вида: обыкновенный С. (*R. campestris*), С. Шарпа (*R. sharpei*) и грисбок, или капский С. (*R. melanotis*). Длина тела 60–90 см, выс. в холке 50–54 см, масса 10–16 кг. Сложение лёгкое, изящное. Рога у самцов, прямые, короткие, гладкие, широко расставленные, округлые в поперечнике. Окраска спины от рыже-бурой до оранжево-бурой, у С. Шарпа – с сероватыми полосками и белыми пятнышками. Нижняя сторона тела белая или желтоватая, у грисбока – буроватая. Распространены в Юж. и Вост. Африке. Обитают на открытых местах, в

мозаично заросших высокой травой или кустарниками каменистых саваннах, густых древесно-кустарниковых зарослях. Питаются листьями и побегами кустарников, плодами и травами, могут выкапывать из земли корни и клубни. При появлении опасности животные затаиваются, плотно прижимаясь к земле и вытянув шею. Держатся поодиночке или парами, маркируют свои участки запахowymi метками. Могут обходиться водой, содержащейся в сочных кормах. Беременность 6–7 мес; обычно 1, редко 2 детёныша. Самка первые 2 нед скрывает их в зарослях. Самки созревают в возрасте 6–8, самцы – после 9 мес. Живут 7–10 лет. Объекты охоты. Численность стабильно высокая.