



СЫПНО́Й ТИФ

Авторы: Б. П. Богомолов

СЫПНО́Й ТИФ, острое инфекц. заболевание, вызываемое риккетсиями и передаваемое платяными вшами. Риккетсии размножаются в эпителии кишечника вши и в эндотелии капилляров человека. При проникновении их в организм заболевшего человека поражаются в первую очередь сосуды головного мозга (развитие менингоэнцефалита), кожи, лёгких, надпочечников. Характеризуется цикличностью течения (чередованием периодов подъёма и спада симптомов заболевания). Проявляется лихорадкой (9–16 дней), головной болью, розеола-петехиальной сыпью, увеличением печени и селезёнки. После перенесённого заболевания и при сохранении в организме риккетсий в их латентном состоянии спустя годы возможен рецидив болезни, которую называют также болезнью Брилла – Цинссера. Возможные осложнения при С. т. – миокардит, пневмония, менингоэнцефалит, тромбофлебит. Лечение: антибиотики (тетрациклин и др.), симптоматич. средства. В эпидемич. очаге проводят санитарную обработку и дезинсекцию. За лицами, находившимися в контакте с больным, ведётся мед. наблюдение в течение 25 дней со времени госпитализации больного. За эпидемич. очагом устанавливают наблюдение до 71 дня. В СССР С. т. как массовое эпидемич. заболевание был ликвидирован.

Литература

Лит.: Лобан К. М. Сыпной тиф. М., 1960.