

# ТАПИРОВЫЕ

Авторы: Н. А. Щипанов



Равнинный тапир.

Фото Diego J. Lizcano / flickr.com

ТАПИРОВЫЕ, тапиры (Tapiridae), семейство млекопитающих отр. непарнокопытных.

Единственный одноим. род (Tapirus) с 4 видами: в Центр. и Юж. Америке обитают равнинный (*T. terrestris*), горный (*T. pinchaque*) и центральноамериканский (*T. bairdii*) тапиры, в Азии (Юго-Вост. Мьянма, Юж. Таиланд, Малайзия, о. Суматра) – чепрачный тапир (*T. indicus*). Характерно наличие короткого хобота на конце морды, образованного носом и верхней

губой. Сложение тяжёлое. Ноги короткие; копыта небольшие. Волосы редкие, щетинистые. Окраска одноцветная тёмная, брюхо несколько светлее. У азиат. *T.* передняя и задняя части тела чёрные, середина – белая. Молодые *T.* (до 6–8 мес) тёмные, с продольными светлыми пятнами и полосками. Обитают в лесах и кустарниковых зарослях, рядом с водоёмами или в заболоченных местностях; в горах до выс. 4500 м. Хорошо плавают и ныряют. Активны в тёмное время суток. Питаются разнообразными растениями, в т. ч. водными. Держатся поодиночке или парами. Размножение не связано с определённым сезоном. Рождается 1, редко 2 детёныша. Живут до 30 лет. Все виды страдают от охоты, нарушения естеств. местообитаний. Согласно Красному списку МСОП, состояние равнинного тапира вызывает тревогу, остальные находятся в угрожаемом состоянии.