

ТОПАКОЛОВЫЕ

Авторы: В. М. Лоскот



Топаколовые. Коричневогорлый хьют-хьют.

ТОПАКОЛОВЫЕ (Rhinocryptidae), семейство птиц отр. воробьинообразных. Длина от 9,5 см при массе от 10,4–14,2 г (андский земляной топакало, *Scytalopus magellanicus*) до 23 см массой 130–185 г (коричневогорлый хьют-хьют, *Pterotochos castaneus*). Ноздри сверху прикрыты роговыми крышечками (отсюда лат. назв.); назв. «Т.» получили из-за внешнего сходства их тела с плодом шиповника (исп. tarascilo). Крылья короткие, закруглённые, хвост небольшой, ноги длинные, сильные. В

окраске преобладают покровительственные тона (чёрный, серый, бурый, коричневый), обычно на голове, шее и нижней стороне тела имеются яркие полосы и пятна.

Обитают в Центр. и Юж. Америке – от Коста-Рики до Патагонии. 12 родов, ок. 57 видов. Предпочитают густые тёмные заросли приземного яруса влажных лесов, некоторые обитают в горных лугах среди кустистых злаков на выс. до 4300 м. Ведут преим. наземный образ жизни; летают мало. Поедают в осн. насекомых и пауков, реже семена и ягоды. Моногамы. В брачный сезон поют и самки, и самцы, известно дуэтное пение. Гнёзда укрыты в конце норы (длина до 3,0 м), вырытой самими птицами или грызунами, иногда расположены среди ветвей на выс. до 7 м, часто на земле среди опавших листьев, в нишах береговых обрывов или дуплах. В кладке обычно 2–3 яйца; насиживают и кормят птенцов оба партнёра. В Красной книге МСОП 12 видов Т., из которых 2 вида находятся в критическом и 4 вида в угрожаемом состоянии, 1 вид уязвим, состояние ещё 5 видов вызывает тревогу.