



ТРОМБОФЛЕБИТ

ТРОМБОФЛЕБИТ (от *тромб* и *флебит*), острое воспаление стенок вены с образованием тромба в её просвете. О патогенезе Т. см. в ст. *Тромбоз*. В развитии Т. имеют значение также нейротрофич. расстройства и аллергич. реакции. Т. нередко возникает при *варикозном расширении вен*, *геморрое*, болезнях крови и сердца, после родов и др. При первичном образовании тромба возникает флеботромбоз с частичной или полной закупоркой и последующим воспалением стенки вены. Активизация системы свёртывания крови (см. *Система гемостаза*), уменьшение продукции *гепарина* и активаторов фибринолиза приводят к снижению активности антисвёртывающей системы гемостаза с образованием тромбов в венах. Т. поверхностных вен ног проявляется острой болью, гиперемией и наличием плотного болезненного тяжа по ходу вены, повышенной темп-рой тела; может распространяться выше, иногда с переходом процесса на глубокие вены. Лечение нестероидными противовоспалит. средствами. Т. глубоких вен развивается при длительном постельном режиме, злокачеств. опухолях. Возможны боль по ходу вены, отёк конечности, цианоз кожи, болезненность при пальпации над поражённой веной. Диагноз уточняют с помощью доплерографии, плетизмографии (исследование кровенаполнения поражённой части тела), флебографии. Лечение: приподнятое положение конечности, антикоагулянты, при необходимости оперативное.

Литература

Лит.: Евдокимов А. Г., Тополянский В. Д. Болезни артерий и вен. 2-е изд. М., 2014.