



ТУЛЯРЕМИЯ

ТУЛЯРЕМИЯ (от назв. местности Туларе в США, в штате Калифорния, где в 1911 впервые выделен у сусликов возбудитель болезни, и греч. – кровь), острое инфекц. заболевание животных и человека с природной очаговостью, проявляющееся лихорадкой и поражением лимфатич. узлов. Источник возбудителя – больные животные (гл. обр. грызуны). Возбудитель проникает в организм человека через кожу, слизистые оболочки глаз, органы пищеварения и дыхательные пути. Инкубац. период от 3 до 7 сут. Осн. симптомы Т.: лихорадка, резкая головная боль, ночная потливость, появление бубонов. По локализации первичных поражений различают бубонную, глазобубонную, абдоминальную, лёгочную и др. формы Т. Лечение стационарное. Назначают антибиотики, водно-электролитные растворы, гемодез, полиглюкин, антигистаминные средства, витамины и др.

Т. болеют все виды с.-х. животных, чаще овцы и пушные звери (более восприимчив молодняк). Заражаются от больных грызунов алиментарным, а также воздушно-капельным путём и при укусах кровососущих членистоногих. Болезнь протекает чаще скрытно или проявляется лихорадкой, поносами, истощением, увеличением лимфатич. узлов, признаками расстройства нервной системы и абортами. У большинства животных течение болезни доброкачественное, у овец и пушных зверей возможны падёж молодняка и снижение продуктивности. Лечение: антибиотики. Профилактика: уничтожение грызунов и клещей, изоляция больных животных и др.

Литература

Лит.: Руководство по инфекционным болезням. 2-е изд. М., 1986.