



ВЫПАДЕНИЕ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА

Авторы: В. Е. Радзинский, Л. Р. Токтар

ВЫПАДЕНИЕ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА (пролапс матки и влагалища, от лат. prolapsus – выпадение), смещение матки и влагалища книзу вследствие дефекта мышц тазового дна. Первые описания В. м. и в. найдены в одном из папирусов Эберса, относящихся к 1760–1550 до н. э. В возникновении В. м. и в. имеют значение предшествующие роды, акушерские травмы промежности, врождённая несостоятельность соединительной ткани, хроническое повышение внутрибрюшного давления, ожирение или астения, пожилой возраст и другие факторы. Среди гинекологических заболеваний доля В. м. и в. составляет 28–39%, в некоторых странах (Египет, Гамбия, Иордания) – 34,1 – 56,3%. Заболевание начинается, как правило, в молодом возрасте, развивается постепенно: сначала опускается задняя стенка влагалища, затем происходит неполное (шейка матки не выходит за пределы половой щели) и полное (вся матка и стенки влагалища выходят за пределы половой щели) В. м. и в. При этом образуется грыжевой мешок, в котором могут находиться смежные с маткой органы (мочевой пузырь, прямая кишка), что приводит к нарушениям генеративной, сексуальной функций, дефекации и мочеиспускания (вплоть до недержания мочи). С наступлением менопаузы заболевание быстро прогрессирует. Лечение хирургическое. Ныне существует множество операций, направленных на устранение В. м. и в. Выбор операции зависит от особенностей заболевания в каждом конкретном случае. Дополнительно проводят консервативное лечение (тренировка мышц тазового дна, медикаментозные средства). При невозможности оперативного лечения применяют маточные кольца (пессарии).

Литература

Лит.: Патология влагалища и шейки матки. 2-е изд. М., 1999.