

ХУТИИ

Авторы: Н. А. Щипанов



Кубинская хутия.

ХУТИИ, хутивые (*Capromyida*), семейство грызунов. Длина тела большинства Х. 21–46 см, хвоста 15–30 см (только у короткохвостых Х. она не превышает 5–6 см), масса 2,8–4 кг. Кубинская Х. (*Capromys pilorides*) достигает в длину 60 см, при массе до 8,5 кг. Голова большая, тяжёлая, морда широкая, притупленная. Уши небольшие, глаза маленькие. Хвост голый или покрыт волосами, у ведущих древесный образ жизни –

хватательный. Лапы широкие, пальцы с сильными когтями. Шерсть грубая, серой или коричневой окраски. 8 родов, 20 видов (около трети из них вымерло). Распространены на островах Вест-Индии. Населяют лесные или скалистые районы, антропогенные ландшафты. Ведут наземный или древесный образ жизни. Убежища находят среди ветвей или в дуплах, расщелинах скал, среди корней. Питаются травами, листьями, корой и плодами деревьев, мелкими животными. Размножаются круглогодично. В помёте 1–3 детёныша. Половой зрелости достигают к 10 мес. Все Х. используются в пищу, кубинская Х. – предмет охоты. Согласно Красному списку МСОП, из 14 сохранившихся видов состояние всех Х., кроме кубинской, вызывает тревогу или уже критическое.