

# ЦАПЛИ

Авторы: Е. А. Коблик



Цапля голиаф.

Фото Hans Hillewaert / flickr.com

ЦАПЛИ, цаплевые (Ardeidae), семейство птиц отр. аистообразных. Известны с эоцена. Распространены всесветно (за исключением высоких широт), тяготеют к околководным биотопам, наиболее разнообразны в тропиках, из умеренных широт на зиму улетают. Ок. 20 родов, 65 видов. В России гнездятся 16 видов из 9 родов. Длина тела от 28–33 см при массе до 100 г и размахе крыльев 52–55 см у волчков (*Ixobrychus*) до 150 см при массе до 4 кг и размахе крыльев до 230 см у цапли голиаф

(*Ardea goliath*). Клюв копьевидный, у *кваквы* он немного укорочен и расширен. Шея тонкая и длинная, из 19–20 удлинённых позвонков; обычно она S-образно изогнута, у выпей и ночных цапель изгиб замаскирован длинными перьями, отчего они выглядят короткошеими и сгорбленными. Ноги длинные, с подвижными цепкими пальцами. Крылья широкие, хвост укорочен. Окраска разнообразная; в брачный период обычно развиваются украшающие перья, становятся яркими клюв, ноги, неоперённое «лицо». Питаются рыбой, земноводными, беспозвоночными, подкарауливая их и хватая молниеносным движением с распрямлением шеи. Есть виды с преим. ночной активностью. Моногамы, размножению предшествуют сложные ритуалы. Гнездятся на деревьях и в заламах тростника, обычно колониями; в кладке 2–5 яиц, птенцы голые или слабоопушённые. 3 вида Ц. – в Красной книге РФ.