

ЦЕСА́РКОВЫЕ

Авторы: Е. А. Коблик



Грифовая цесарка.

Фото Carol Foil / flickr.com

ЦЕСА́РКОВЫЕ, цесарки (Numididae), семейство птиц отр. курообразных. 4 рода, 6 видов. Размеры от 40 см с массой 700 г у чёрной цесарки (*Agelastes niger*) до 72 см при массе 1,6 кг у грифовой цесарки (*Acyllium vulturinum*). Сложение плотное, большинство выглядят кургузыми из-за короткого как бы «поджатого» хвоста. Маленькая голова и часть шеи голые, кожа обычно окрашена в яркие тона; у хохлатых цесарок (*Guttera*) развит пышный хохол, у шлемоносной цесарки (*Numida meleagris*) имеются роговой шлем и серёжки. Оперение у большинства видов с мелким «жемчужным» рисунком. Голос резкий. Ц. – эндемики Африки, населяют саванны, лесные опушки, заросли кустарников. Питаются семенами, плодами, насекомыми. Ведут

наземный образ жизни, прекрасно бегают, летают неохотно, обычно держатся стайками. Наземные гнёзда хорошо укрыты, в кладке до 20 (обычно 6–12) чуть меньше куриных, с очень толстой скорлупой яиц. Насиживает самка. Выводки не распадаются до 5 мес. Большинство видов обычны, являются традиц. объектами охоты. Белогрудая цесарка (*Agelastes meleagrides*) – житель лесов крайнего запада Африки – редка, внесена в Красную книгу МСОП. Шлемоносная цесарка одомашнена с античных времён, широко распространена в птицеводч. хозяйствах, акклиматизирована во многих странах мира.