

ЧЕКАНЫ

Авторы: Е. А. Коблик



Луговой чекан.

Фото В.В. Климова

ЧЕКАНЫ (*Saxicola*), род насекомоядных воробьиных птиц сем. мухоловковых. Ранее их относили к сем. дроздовых. 13 видов. Обитают на открытых пространствах Евразии, Африки, Мадагаскара, Канарских о-вов, некоторых архипелагов Индийского и Тихого океанов. Из умеренных широт на зиму улетают. Длина 12–13 см, масса 14–22 г, размах крыльев 21–24 см. Характерны пёстрая окраска, вертикальная посадка тела, хвост иногда бывает длинным, ступенчатым. Самцы заметно ярче и контрастнее самок. Позывки – негромкое «чек-чек» (отсюда назв.). Охотятся, высматривая добычу с присады,

часто ловят насекомых в воздухе. Аккуратное чашевидное, обычно хорошо замаскированное гнездо из стеблей трав самка строит в углублениях почвы. В кладке 5–6 яиц. В Европ. части России обычен луговой Ч. (*S. rubetra*), в Сибири и на Кавказе – черноголовый Ч. (*S. torquatus*). Большой Ч. (*S. insignis*), очагами гнездящийся на Алтае и в Монголии, внесён в Красную книгу МСОП.