


ЯГУАР

Авторы: Н. А. Щипанов



Ягуар.

ЯГУАР (*Panthera onca*), млекопитающее сем. кошачьих подсемейства больших кошек. Длина тела до 190 см, хвоста до 75 см, масса до 120 кг. Самцы крупнее самок. Голова тяжёлая, уши округлые на вершинах. Мех низкий, плотный, густой. Окраска спины желтоватая, губ, нижней части морды, брюха и внутр. стороны лап – беловатая. По всей поверхности тела разбросаны тёмные пятна. Встречаются чёрные Я. Распространён в Центр. Америке (до Мексики) и в Юж. Америке (до Парагвая и севера Аргентины),

исключая зап. побережье, высокогорья и центр. области континента. Населяет разл. ландшафты – от дождевых тропич. лесов до низкорослых аридных лесов и кустарниковых зарослей. В горах поднимается до выс. 2000 м. Я. держится поодиночке. Активность ночная. Хорошо лазает по деревьям. Охотится на разл. позвоночных животных, включая оленей, приматов, броненосцев, кайманов и крокодилов, черепах, анаконд, поедает яйца морских черепах; нападает на домашний скот. Спаривание не приурочено к определённому сезону. Логово устраивает в дуплах деревьев или др. укрытиях. Обычно рождаются 2 (до 4) детёныша, которые покидают мать в 1–2 года. Самка вырашивает потомство одна. Половой зрелости самки достигают в 2 года, самцы в 3-летнем возрасте. В природе живёт 12–15 лет, в неволе – до 23 лет. В 20 в. ареал Я. значительно сократился как из-за охоты ради ценной шкуры, так и вследствие антропогенной трансформации ландшафтов. Численность Я. сохраняет тенденцию к снижению. В Красной книге МСОП состояние вида оценено как близкое к угрожаемому.