



ЭМФИЗЕМА ЛЁГКИХ

ЭМФИЗЕМА ЛЁГКИХ (от греч. ἐμφύσημα – вздутие), патологич. состояние лёгких, характеризующееся увеличенным содержанием в них воздуха. Из мн. видов Э. л. наибольшее клинич. значение имеет т. н. истинная (альвеолярная, везикулярная) Э. л., при которой наблюдается необратимое поражение лёгких с деструкцией, атрофией межальвеолярных перегородок, разрушением эластич. волокон лёгочной ткани. Она сопровождается также уменьшением подвижности лёгких, нарушением функций дыхания и кровообращения вследствие уменьшения поверхности, через которую происходит газообмен в лёгких. Факторы риска: наследственность, курение, проф. вредности, инфекции дыхательных путей (хронич. бронхит и др.). Осн. проявления: постепенно развивающаяся одышка (сначала при физич. нагрузке, затем и в покое), [цианоз](#), бочкообразная форма грудной клетки; при перкуссии выявляются т. н. коробочный звук, опущение нижних границ лёгких; при аускультации лёгких – ослабленное дыхание. Диагноз уточняют при рентгенологич. исследовании органов грудной клетки. Лечение осн. заболевания (хронич. бронхита и др.); устранение дыхательной недостаточности; лечебная физкультура; исключение курения и др. вредных воздействий.

Литература

Лит.: Болезни органов дыхания / Под ред. Н. Р. Палеева. М., 1990. Т. 3.