



ЭНДОМЕТРИТ

ЭНДОМЕТРИТ (от *эндо...*, греч. μήτρα – матка и *...ит*), воспаление слизистой оболочки матки в связи с проникновением в неё патогенных микробов (стрепто-, стафило- и гонококков, трихомонад, хламидий и др.). Чаще развивается после родов, абортов. Обычно в процесс вовлекается мышечный слой матки (эндомиометрит). Острый Э. развивается через 3–4 дня после родов, аборта. Отмечаются лихорадка, озноб, в крови – лейкоцитоз, увеличение СОЭ; жалобы на боль внизу живота, головную боль, слабость и др. Выделения из половых путей становятся мутными, нередко с гнилостным запахом. Возможна задержка выделений в матке с последующим нагноением. Иногда воспаление распространяется на все слои матки, её придатки (сальпингоофорит), параметрий (*параметрит*). Острый Э. длится 8–10 дней. При несвоеврем. лечении может перейти в хронич. форму, симптомы которой недостаточно отчётливы. Наблюдаются умеренное уплотнение и увеличение матки, *бели*, нарушение менструального цикла. Хронич. Э. часто сопутствуют сальпингит, снижение функции яичников, бесплодие, экстрагенитальные заболевания, аллергич. реакции. Диагноз подтверждается результатом бактериологич. исследования выделений из матки, УЗИ матки и придатков. Лечение: антибиотики, анальгетики, спазмолитич. средства, промывание матки антисептич. растворами. При хронич. Э. – физиотерапевтич. процедуры, бальнеотерапия, *акупунктура*.