

ШИНШИЛЛЫ

Авторы: Н. А. Щипанов



Малая шиншилла.

Фото Josh More / flickr.com

ШИНШИЛЛЫ (*Chinchilla*), род грызунов сем. шиншиловых. 2 вида: короткохвостая, или большая, Ш. (*C. chinchilla*) и малая, или длиннохвостая, Ш. (*C. lanigera*). Длина тела 22–38 см, хвоста – 7,5–15 см, масса 0,5–1 кг. Голова относительно большая, глаза и уши крупные. Шерсть плотная, густая, мягкая, сильно опушён хвост. Окраска спины голубовато-серая или

коричневато-серая с черноватым оттенком, брюшная сторона беловатая.

Распространены в Андах. Населяют скалистые участки на выс. 3000–6000 м. В качестве убежищ обычно используют расщелины и естеств. пустоты в скалах. Селятся колониями (до сотни и более особей). Активность ночная. Питаются разл.

травянистыми растениями, корой кустарников, мякотью кактусов, насекомыми.

Моногамы. В году до 3 помётов, 1–6 детёнышей в каждом. Половозрелыми становятся

в 5–8 мес. Живут ок. 10 лет, в неволе до 20. Обладают очень ценным мехом. В

результате интенсивного промысла численность Ш. сильно снизилась (тенденция к снижению сохраняется). Согласно Красному списку МСОП, состояние Ш. в природе

угрожаемое. На зверофермах ради получения меха разводят длиннохвостую Ш.;

зверьков нередко содержат как домашних питомцев.